

Patientinformation om behandling med ikke – permanente filler produkter

Ikke – permanente filler produkter

Produkterne er sterile geler, der består af vand, stabiliseret hyaluronsyre og 0,3 % Lidocain, som er en lokalbedøvelse.

De injiceres i huden for at korrigere linjer, rynker og folder i ansigtet, forstørre læberne og danne ansigtskonturer og således genskabe tabt volumen. De bruges også til at genoprette hudens elasticitet og reducere uregelmæssigheder i hudens overflade som opstår med tiden og som et led i den naturlige aldring. Arvelige faktorer og miljøpåvirkninger som bl.a. rygning og alkohol samt udsættelse for sol kan fremskynde denne proces.

En behandling giver et langvarigt, men ikke permanent resultat. Vi forventer en holdbarhed på 6-12 måneder i huden og 3-6 måneder i læberne. Der anbefales en kontrol ca. 14 dage efter behandlingen med henblik på en eventuel opfølgende behandling, hvorved resultatet holder længere.

Før en evt. behandling med filler, skal du have en lovpligtig forundersøgelse hos en af vores kosmetiske sygeplejersker senest 48 timer inden behandlingen. Til forundersøgelsen gennemgår vi dine ønsker og forventninger til resultatet. Sammen kigger I på dit ansigt og taler de forskellige muligheder igennem. Ud fra dette lægges en behandlingsplan og informeres om efterforløbet, mulige risici og bivirkninger.

Herefter skal der gå min. 48 timer, før selve behandlingen kan foretages, da dette er en lovpligtig betænkningstid.

Behandlingen

Selve behandlingen foregår ved, at din hud først rengøres. Herefter anvendes en tynd engangssprøjte til at injicere filleren i det ønskede område. Du har mulighed for at få lokalbedøvelse på området, inden vi påbegynder behandlingen. Vi afsætter altid 30 min. til en behandling med filler. Selve behandlingen tager mellem 5- 20 min. afhængigt af, hvor mange samt hvilke områder, du skal have behandlet. Efter behandlingen vil du kunne genoptage dit arbejde og almindelige gøremål.

Normale reaktioner umiddelbart efter behandlingen

Der ses mindre rødme, ømhed, hævelse og kløe i det behandlede område. Der kan opstå enkelte blå mærker, og der er rapporteret små buler. Alle gener forsvinder som regel efter et par dage.

Ved læbeforstørrelse vil der være hævelse i et par dage, og hos nogle få kan hævelsen vare op til en uge. Læberne kan være lidt ujævne i den periode, således at det umiddelbare resultat ikke er det endelige resultat. Nogle har haft gavn af at tage antihistamin, der kan købes i håndkøb.

Komplikationer

I sjældne tilfælde er der rapporteret:

- Lette til moderate betændelsesreaktioner, som er opstået dage eller uger efter behandlingen.
- Langvarig hærdelse, pusdannelse og grålig misfarvning ved behandlingsstedet.
- Sårskorper og dødt væv ved behandlingsstedet, som kan medføre en overfladisk ardannelse.
- Under øjnene kan der forekomme langvarig hævelse.
- Betændelsesreaktioner opstået 1-2 måneder efter behandlingen.
- Dyb rød misfarvning af huden udover det behandlede område, som kan brede sig over næsen.

I ekstremt sjældne tilfælde er der på verdensplan indrapporteret enkelte tilfælde af blindhed ved indsprøjtning med filler.

Hvis der, mod forventning, skulle opstå nogen af de ovennævnte komplikationer, eller andet, der bekymrer dig, er det VIGTIGT, at du kontakter klinikken med det samme på vores AKUT TELEFON, da vi har den nødvendige ekspertise og læger til at håndtere sådanne situationer. Jo hurtigere man kommer i behandling, jo bedre, og vi vil hellere have en opringning for meget end en for lidt.

Det er muligt at opløse filleren, hvis der mod forventning skulle opstå et uønsket resultat.

AKUT telefonen er altid åben og kan benyttes også uden for åbningstid: 25569911

Husk efter behandlingen:

- Undgå store temperaturforskelle i et par dage, dvs. solarium og sauna, samt hård træning den første dag.
- Undgå at røre de behandlede områder i 6 timer og brug ikke makeup samme dag.
- Hvis du tager medicin med acetylsalicylsyre (f.eks. Kodimagnyl, Hjertemagnyl eller Treo), har du større tendens til blå mærker. Det anbefales at holde pause med fiskeolie et par dage før og efter behandlingen.
- Hvis du tidligere har haft et forkølelsessår, er der en risiko for, at kanylehullerne kan fremprovokere et nyt udbrud. Der anbefales t.b. Valaciclovir, som fås på recept hos egen læge.
- Undgå at plukke hår i det område, hvor behandlingen udføres, samme dag.